



Doença do trato urinário inferior em felinos

Tatiana Graebin

Médica veterinária, pós-graduada em Clínica Médica e Cirúrgica de Cães e Gatos CRMV 7431

A doença do trato urinário inferior felino ou síndrome urológica felino, é comum, porém pouco compreendida.

Os sinais de doença incluem dificuldade em urinar, vocalização, tentativas frequentes de urinar, urina com sangue ou urinar fora da caixa. Na obstrução ao fluxo urinário, podem haver dor e letargia, vômitos e debilidade. Os tipos mais frequentes incluem uma condição inflamatória na bexiga e na uretra, assim como a formação de cristais ou cálculos na urina.

Os gatos afetados têm idades entre os 2 e os 6 anos, mas pode ocorrer em qualquer idade, quando são sedentários e com excesso de peso. Outros fatores incluem o stress, mudança no ambiente ou na caixa das necessidades, dieta ou água de bebida.

Tratamento: Um médico veterinário deve examiná-lo o mais breve possível. Se o animal estiver obstruído, deverá ser sondado para resolver a obstrução, enquanto a reposição de fluidos e medicação deve estabilizar o animal.

Em casa: Após ser examinado, o seu gato irá necessitar de uma dieta formulada para minimizar a formação de cristais na urina e para manter um pH urinário ácido. Deverá ter sempre água fresca ao dispor. O gato é atraído, ingerindo assim mais água. Outras medidas são: uso de duas caixas limpas e acessíveis, exercício e perda de peso em gatos obesos, minimizar o stress ou mudanças na rotina.

para ver outros conteúdos.
